

IM-総合型 解答

[I]

(1) $x = 1.\dot{7}1\dot{1}$ とおくと $1000x = 1711.\dot{7}1\dot{1} = 1710 + x$ だから, $x = \frac{1710}{999} = \frac{190}{111}$.

(答) $\frac{190}{111}$

(2) 解と係数の関係より

$$\alpha + \beta = \frac{3}{2}, \quad \alpha\beta = 2$$

であるから,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} &= \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{3}{4} \\ \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{\beta} &= \frac{1}{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

よって, $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ を 2 つの解とする 2 次方程式の 1 つは

$$x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} = 0$$

両辺に 4 をかけて

$$4x^2 - 3x + 2 = 0$$

(答) $4x^2 - 3x + 2 = 0$

(3) AB の傾きは $\frac{1-3}{5-2} = -\frac{2}{3}$. よって, 直線 AB に垂直な直線の傾き m は

$$m = \frac{3}{2}$$

また, AB の中点は

$$\left(\frac{2+5}{2}, \frac{3+1}{2} \right) = \left(\frac{7}{2}, 2 \right)$$

よって, 線分 AB の垂直二等分線の方程式は

$$y = \frac{3}{2} \left(x - \frac{7}{2} \right) + 2$$

すなわち

$$y = \frac{3}{2}x - \frac{13}{4}$$

(答) $y = \frac{3}{2}x - \frac{13}{4}$

(4) $b_n = \frac{1}{1-a_n}$ とおくと, 数列 $\{b_n\}$ は初項 $b_1 = \frac{1}{1-0} = 1$, 公差 1 の等差数列だから,
 $b_n = 1 + (n-1) \cdot 1 = n$. よって $n = \frac{1}{1-a_n}$ で, $a_n = 1 - \frac{1}{n}$.

【別解】 $a_n = \frac{n-1}{n}$ と予想して数学的帰納法を用いてもよい.

(答) $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

(5) 不等式を変形して

$$\begin{aligned}\cos 2\theta - 3 \cos \theta + 2 &\geq 0 \\ 2 \cos^2 \theta - 1 - 3 \cos \theta + 2 &\geq 0 \\ 2 \cos^2 \theta - 3 \cos \theta + 1 &\geq 0 \\ (\cos \theta - 1)(2 \cos \theta - 1) &\geq 0\end{aligned}$$

よって

$$\cos \theta \geq 1 \text{ または } \cos \theta \leq \frac{1}{2}$$

$0 \leq \theta \leq \pi$ より

$$\theta = 0 \text{ または } \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \pi$$

(答) $\theta = 0, \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \pi$

(6)

$$2^{10} = 1024 < 2026 < 2048 = 2^{11}$$

より

$$\begin{aligned}\log_2 2^{10} &< \log_2 2026 < \log_2 2^{11} \\ 10 &< \log_2 2026 < 11\end{aligned}$$

よって, $\log_2 2026$ の整数部分は 10 である.

(答) 10

[II]

(1) 賞金 X (円) が a (円) である確率を $P(X = a)$ と表し, a (円) 以下である確率を $P(X \leq a)$ と表す. 白玉の個数 w 個, 青玉の個数 b 個, 赤玉の個数 r 個として, (w, b, r) と表す. 賞金は $(w, b, r) = (0, 2, 1)$ のときが最高で 200 円であり, 賞金が 150 円以下になるのはその余事象であるから求める確率は

$$P(X \leq 150) = 1 - P(X = 200)$$

である. $P(X = 200)$ は $(w, b, r) = (0, 2, 1)$ となる確率であるから

$$P(X = 200) = \frac{{}_2C_2 \times {}_1C_1}{{}_6C_3} = \frac{1}{\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1}} = \frac{1}{20}$$

よって

$$P(X \leq 150) = 1 - P(X = 200) = 1 - \frac{1}{20} = \frac{19}{20}$$

(2) 賞金 X のとり得る値は, $X = 50, 100, 150, 200$ であり, それぞれの確率を求める.

$P(X = 50)$: $(w, b, r) = (2, 1, 0)$ のときであるから

$$P(X = 50) = \frac{{}_3C_2 \times {}_2C_1}{{}_6C_3} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

$P(X = 100)$: $(w, b, r) = (1, 2, 0), (2, 0, 1)$ のときであるから

$$P(X = 100) = \frac{{}_3C_1 \times {}_2C_2 + {}_3C_2 \times {}_1C_1}{{}_6C_3} = \frac{3 + 3}{20} = \frac{3}{10}$$

$P(X = 150)$: $(w, b, r) = (1, 1, 1)$ のときであるから

$$P(X = 150) = \frac{{}_3C_1 \times {}_2C_1 \times {}_1C_1}{{}_6C_3} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

$P(X = 200)$: $(w, b, r) = (0, 2, 1)$ のときであり, (1) より

$$P(X = 200) = \frac{1}{20}$$

よって, X の期待値 $E(X)$ は

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times P(X = 0) + 50 \times \frac{3}{10} + 100 \times \frac{3}{10} + 150 \times \frac{3}{10} + 200 \times \frac{1}{20} \\ &= 15 + 30 + 45 + 10 = 100 \end{aligned}$$

(答) (1) $\frac{19}{20}$ (2) 100 円

[III]

(1) $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 9 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 16 = 13$ より

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -6$$

(2) $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{-6}{3 \cdot 4} = -\frac{1}{2}$. ここで, $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ より,

$$\theta = 120^\circ$$

(3) $\left| \frac{t}{3}\vec{a} + \frac{1-t}{4}\vec{b} \right|$ が最小値をとるのは, $\left| \frac{t}{3}\vec{a} + \frac{1-t}{4}\vec{b} \right|^2$ が最小値をとるときである.

$$\begin{aligned} \left| \frac{t}{3}\vec{a} + \frac{1-t}{4}\vec{b} \right|^2 &= \frac{t^2}{9}|\vec{a}|^2 + \frac{t(1-t)}{6}\vec{a} \cdot \vec{b} + \frac{(1-t)^2}{16}|\vec{b}|^2 \\ &= 3t^2 - 3t + 1 \\ &= 3\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

よって, $\left| \frac{t}{3}\vec{a} + \frac{1-t}{4}\vec{b} \right|^2$ は $t = \frac{1}{2}$ のとき, 最小値 $\frac{1}{4}$ をとる. したがって, $\left| \frac{t}{3}\vec{a} + \frac{1-t}{4}\vec{b} \right|$

は $t = \frac{1}{2}$ のとき, 最小値 $\sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$ をとる.

(答) (1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -6$ (2) $\theta = 120^\circ$ (3) 最小値 $\frac{1}{2}$ ($t = \frac{1}{2}$ のとき)

[IV]

(1) $f(-1) = 1$ だから, $y = a(x+1) + 1$.

(2) $f'(x) = 3x^2 - 6x$ なので, $a = f'(-1) = 9$. このとき, l の方程式は $y = 9x + 10$ であって, $f(x) - (9x + 10) = x^3 - 3x^2 + 5 - (9x + 10) = (x+1)^2(x-5)$ だから, l と C で囲まれた図形の面積は

$$\begin{aligned} -\int_{-1}^5 (x+1)^2(x-5)dx &= -\int_{-1}^5 \{(x+1)^3 - 6(x+1)^2\}dx \\ &= -\left[\frac{(x+1)^4}{4} - 2(x+1)^3\right]_{-1}^5 \\ &= 2 \cdot 6^3 - \frac{6^4}{4} = \frac{6^3}{2} = 108. \end{aligned}$$

(3) $x^3 - 3x^2 + 5 = a(x+1) + 1$ を整理すると, $(x+1)(x^2 - 4x + 4 - a) = 0$.

$x^2 - 4x + 4 - a = 0$ が -1 以外の異なる 2 つの実数解を持つことが必要十分なので, $(-2)^2 - (4-a) > 0$ かつ $(-1)^2 - 4 \cdot (-1) + 4 - a \neq 0$, すなわち $a > 0$, $a \neq 9$.

(答) (1) $y = a(x+1) + 1$ (2) 108 (3) $a > 0$, $a \neq 9$